Projet ANACONDHA

Analyse spatiale de la connectivité fonctionnelle des habitats à l'échelle de l'estuaire

Maria Alp et Céline Le Pichon

**en collaboration avec
Nicolas Bacq, Eric L'Ebrelec et Stéphanie Moussard**

17 mai 2017, Rouen
Séminaire scientifique GIP Seine Aval

Un estuaire exposé à la marée

Complexité spatio-temporelle des dynamiques hydrologiques

- tidale: flot et jusant
- saisonnière: débit, coefficient de la marée (CM)

Vive-eau
CM 95

Source: GIP Seine Aval

Estuaire: cycles de vie « connectés »

Patrons d'utilisation de l'habitat

Schéma conceptuel (adapté de Rountree et Able (2007)) illustrant les six types de patrons de distribution de l'ichtyofaune parmi les habitats estuariens, résultant de différents patrons de fonctionnalité des habitats.

Canalisation, disparition d'habitat, construction des digues: quelles conséquences pour la connectivité fonctionnelle?

Projet ANACONDHA

- **Objectif principal:** quantifier la connectivité fonctionnelle de l'estuaire pour les espèces de poissons avec des cycles de vie différents
- **Approche :** modélisation géomatique 2D (ANAQUALAND)

ANACONDHA: étapes du projet

- Etude bibliographique, consultation des experts:
➔ Une liste des espèces candidats compilée
- Récupération des données géomatiques nécessaires
- Modélisations pour deux cas d'étude sélectionnés

Truite de mer: migration saisonnière vers les affluents

Source: GIP SA

Juvéniles du bar commun: migrations journalières vers les zones intertidales

Réalisation : GIP Seine-Aval, 2013
Source des données : IGN-BDalti, SHOM, GPMH, GPMR, SANDRE

Source: GIP SA

Estuaires en tant que nurseries

- Zones intertidales particulièrement appropriées comme nurseries:
 - peu profondes
 - productives
 - à l'abri des grands prédateurs

Les nourriceries et les dynamiques estuariennes : à la recherche des goulets d'étranglement

«Connectivité
chronologique »
intacte

Disponibilité
d'habitat réduite à
certains moments
de la marée

Connectivité
fonctionnelle
interrompue à
certains moments
de la marée

basse mer

pleine mer

Cas d'étude:
Juvéniles du bar commun
(*Dicentrarchus labrax*)

Limite de la distribution: salinité
($> 0.05\text{‰}$)

Mobilité des juvéniles:

- 0-0.3 m/s
- Dispersion sélective tidale

Juvéniles de bar: Types d'habitat

Habitats de repos (jusant/basse mer):

Petites profondeurs + basses vitesses

Nourriceries (flot/pleine mer):

Petites profondeurs + substrats sablo-vaseux
(vasières, filandres)

Photo: S.Moussard

Approche géomatique 2D: analyse de chemin de moindre coût

- Habitats cibles
- Résistance du paysage au mouvement :
spécifique à l'espèce et au stade

→ calcul des “distances fonctionnelles”

Analyse spatiale

Habitats cibles
+

Résistance du paysage
(spécifique au cas d'étude)

Modélisation du moindre coût

Carte de résistance
minimale cumulée

Logiciel: Anaqualand 2.0

Analyse spatiale

Probabilité d'accès
à l'habitat cible le
plus proche

Application de l'approche aux juvéniles du bar: colonisation de l'estuaire de la Seine

Ressources:

- Modèle hydrodynamique Mars3D
- Modèle digital de terrain
- Types de substrats : données spatialisées

Modélisation chronologique de la connectivité

La marée est divisée en
10 pas de temps à la base
des cartes des hauteurs
d'eau:

- état des digues
submersibles
- accessibilité des
filandres

niveau d'eau
basse mer

pleine mer

1. Variation de la disponibilité d'habitat pendant la marée

Coefficient de la marée: 85
Débit: 250 m³/s

Variation spatio-temporelle de la distribution d'habitat : début de la marée (t0)

Départ de la colonisation:
zones peu profondes à l'embouchure

Variation spatio-temporelle de la distribution d'habitat

Variation spatio-temporelle de la distribution d'habitat

Variation spatio-temporelle de la distribution d'habitat

Variation spatio-temporelle de la distribution d'habitat

Variation spatio-temporelle de la distribution d'habitat

Variation spatio-temporelle de la distribution d'habitat

Variation longitudinale en distribution d'habitat

nord

sud

début du flot

Pleine mer
195 min

2. Variation de la résistance au mouvement pendant la marée

Définie à base de

- niveau d'eau, barrières,
- vitesses de courant (facilitant ou barrière)

Coefficient de la marée: 85

Débit: 250 m³/s

Variation de la résistance au mouvement

Variation de la résistance au mouvement

Variation de la résistance au mouvement

Variation de la résistance au mouvement

Variation de la résistance au mouvement

Variation de la resistance au mouvement

3. Analyse de la connectivité chronologique

Pour chaque pas de temps:

- une carte d'habitats cibles
- une carte de la résistance au mouvement

Logiciel: ANAQUALAND

Analyse de la connectivité: colonisation de l'estuaire

Scénarios testés

Mobilité

- Passive (capacité de dispersion négligeable)
- Active (capacité de dispersion: 0.3 m/s)

Vitesses moyennes de dispersion pendant un flot

- 0.1 m/s
- 0.25 m/s
- 0.5 m/s

Analyse de la connectivité: front de la colonisation

Nombre des taches d'habitat connectées

Surface des taches d'habitat connectées

Quelles chemins de dispersion ?

A photograph of a suspension bridge over a body of water at dusk. The bridge is illuminated by its own lights, and the sky is a deep blue with some clouds. In the foreground, there is a rocky shoreline with some concrete structures. The text "4. Mettre les résultats dans une perspective temporelle plus large" is overlaid on the image in white.

4. Mettre les résultats dans une perspective temporelle plus large

Variations des conditions hydrologiques

- coefficient de la marée ↑↑
- débit ↑

Effets des conditions hydrologiques sur la disponibilité des nourriceries

CM	débit (m³/s)	ha (PM)	perte habitat (%)
115	800	323	12
115	250	345	6
85	250	357	3
45	250	368	0

Résumé

- La distribution des habitats et la connectivité du paysage estuariennes varient spatialement et temporellement
- Dynamique de la marée: fragmentation des nourriceries entre la basse et la pleine mer (taches plus nombreuses et plus petites)
- Coefficients de la marée (et le débit): une autre source de variation

Remerciements

Jérémy Lobry, Sylvain Duhamel, Eric Feunteun, Hélène de Pontual, Ronan LeGoff, Mike Pawson

Florian Rozanska, Germain Sanson, Ivan Mirkovic, Geoffroy Garot, Emilien Bordier, Geoffrey Bailleul, Stéphane Forgeois, Laetitia Soulier, Thomas Dupuis, Frank Mace, Régis Royer, Hassan El-Machkouri, Morgane Boisramé, Mathieu Lefrançois, Kevin Caillebotte, Delphine Clement, Maxime Fauvel, Vincent Lefebvre, Rod Lefée, Arnaud Rosan, Claire Bertolone

Jean-Philippe Lemoine, Sylvain Descloux, Amandine Zahm

Financements: GIP Seine Aval (projet ANACONDHA)
équipe Hydroécologie fluviale

Logiciel Anaqualand utilisé pour les analyses (en libre accès):

<https://www6.rennes.inra.fr/sad/Outils-Produits/Outils-informatiques/Anaqualand>

A scenic view of a suspension bridge over a body of water at dusk. The bridge is illuminated, and the sky is a deep blue with some clouds. In the foreground, there is a rocky shoreline with some concrete structures. The text "Merci de votre attention!" is overlaid in the center of the image.

Merci de votre attention!